

Tabellen bij dossier Middelengebruik

In de onderstaande tabel staan de afkapwaarden voor diverse verboden middelen bij urinecontrole¹:

Component	Screening	Cut-off
Amfetamine	amfetamine	1000 ug/l
Cannabinoïden	1-nor-d9-THC-9-COOH	50 ug/l
Cocaïne	benzoylecgonine	150 ug/l
Methadon/EDDP	methadon	100 ug/l
Opioïden	heroïne, morfine, cocaïne	300 ug/l
XTC	MDMA	500 ug/l
Barbituraten	fenobarbital	200 ug/l
Benzodiazepinen	Diazepam (valium)	200 ug/l
Alcohol	Ethanol	-
GHB	gammahydroxyboterzuur	-

De volgende medicijnen en stoffen kunnen een vals positieve uitslag geven²:

Drugs	Medicatie
XTC (MDMA)	Trazodon
Opiaten	Floxine
	Levaquin
	Codeïne
GHB	Ethanol
LSD	Chlorpromazine

Duur van de aantoonbaarheid³:

Aantoonbaarheid drugs in urine	
Alcohol	2 tot 5 dagen
Tabak	Tot 2 dagen
Cannabis	Tot 5 dagen bij incidenteel gebruik, tot een maand bij frequent gebruik
Cocaïne / coke	2 tot 5 dagen bij incidenteel gebruik, tot 8 dagen bij intensief gebruik
XTC	1 tot 3 dagen
Amfetamine/speed	1 tot 4 dagen
Paddo's	1 tot 2 dagen
GHB	Tot 12 uur
Efedrine	Tot 3 dagen
LSD	Tot 2 dagen (afhankelijk van dosis)
Heroïne	2 tot 5 dagen
Morfine	2 tot 3 dagen
Opium	2 tot 3 dagen
Methadon	2 tot 5 dagen
Benzodiazepine	2 tot 4 dagen bij therapeutisch gebruik, 4 tot 6 weken bij chronisch gebruik
Mescaline	Tot 72 uur
DMT	Tot 72 uur
PCP	Tot 2 tot 3 dagen
Khat / qat	Tot 3 dag
Lachgas	Niet aantoonbaar
Ketamine	48 uur

¹ Gegevens afkomstig van Diagnostiek voor U verkregen op 29 mei 2013

² Gegevens afkomstig van Diagnostiek voor U verkregen op 29 mei 2013

³ Gegevens afkomstig van Jellinek, <https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/hoe-lang-zijn-alcohol-en-drugs-aantoonbaar/>

Bijgebruik aantonen:

	01-01-2018	14-02-2018	afkapwaarde
Cannabis/THC (ng/ml)	958	427	>50
Kreatinine (mmol/l)	40	14	>2,0
THC/creatinine-ratio	24	30,5	n.v.t.